

TARO-Fingolimod

AVERTISSEMENT : POUR LES COUPLES EN ÂGE DE PROCRÉER

TARO-FINGOLIMOD ET TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION CHEZ LES FEMMES

Des études réalisées sur des animaux suggèrent que le Taro-Fingolimod est susceptible d'avoir des effets nuisibles sur un enfant à naître.

- Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin peut alors vous demander de réaliser un test de grossesse avant de commencer votre traitement au Taro-Fingolimod afin de vérifier de manière formelle que vous n'êtes pas enceinte.
- Une contraception efficace **DOIT** être utilisée durant le traitement et pendant deux mois après l'arrêt du traitement, car jusqu'à deux mois sont nécessaires pour éliminer complètement le médicament de l'organisme.
- Discutez avec votre médecin ou professionnel de santé d'une contraception efficace afin de prévenir toute grossesse pendant toute la durée du traitement.
- Voici quelques sites Web pouvant vous informer sur les moyens de contraception disponibles :
 - sexandu.ca (contient un livret téléchargeable détaillé sur les méthodes de contraception)
 - plannedparenthood.org (en anglais ou espagnol seulement)
 - womenshealthmatters.ca

TARO-Fingolimod

AVERTISSEMENT : POUR LES COUPLES EN ÂGE DE PROCRÉER

TARO-FINGOLIMOD ET TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION CHEZ LES FEMMES

- En cas de grossesse, parlez-en à votre médecin immédiatement.
- Si vous tombez enceinte en prenant Taro-Fingolimod, vous pouvez appeler le registre de grossesse Taro-Fingolimod au 1.866.877.5180.
- Le Taro-Fingolimod est sécrété dans le lait maternel. Il n'existe pas d'informations sur la façon dont le médicament pourrait affecter le nourrisson allaité ou la production de lait. Il n'est pas recommandé d'allaiter un nourrisson tout en prenant ce médicament.

Taro-Fingolimod et reproduction masculine

Les données dont nous disposons ne suggèrent pas que le Taro-Fingolimod puisse être toxique pour un enfant à naître lorsque c'est le père qui le prend.

- Néanmoins, par mesure de précaution, certains cliniciens conseilleraient aux hommes d'arrêter de prendre du Taro-Fingolimod au moins trois mois avant d'envisager de faire un enfant.

